

\_ Fecha de hoy: \_\_\_\_\_

Escuela: \_\_\_\_\_

Maestro: \_\_\_\_\_

Para hacer ejercicio: \_\_\_\_\_ Inhalador \_\_\_\_\_ soplos 15-30 minutos antes del ejercicio

Intervención inmediata es necesaria cuando el estudiante mencionado anteriormente exhibe cualesquiera de los siguientes síntomas de ataque de asma:

Tos constante    Falla de Aire    Pecho congestionado    Respiración sibilante/Retracción del pecho completas    Incapaz de hablar en oraciones

Pasos a tomar durante un ataque de asma:

Administre medicamentos de asma de emergencia de acuerdo con lo siguiente:

	Medicamento Para un Pronto Alivio	Dosis	Frecuencia
<input type="checkbox"/>	Albuterol Inhalador	2-4 soplos con accesorio	Parar la tos, cada 2-4 horas, según lo necesite
<input type="checkbox"/>	Albuterol Neb		
<input type="checkbox"/>	Xopenex Neb		
<input type="checkbox"/>	Otros medicamentos		

Reevalúe en 10-15 minutos y reclasifique al niño de acuerdo a lo siguiente:

	Tos	Frecuencia Respiratoria	Contracción del músculo o recogimiento del pecho	Dificultad para respirar o dificultad para respirar
Normal	Ninguna a ocasional	Normal Frecuencia 2-4 años <32 5-6 años <28 7-14 años <25 >15 años <22	Ninguna	Normal Habla fácilmente en oraciones completas
Los síntomas del asma continúan	Muy frecuente a constante	> normal para su edad	Presente	Habla en oraciones cortas o solo dice palabras

Si el niño:

- < Normal: el niño puede regresar al salón de clase
- < Continúa con los síntomas del asma: continúe con el medicamento mencionado listado en el punto número 1, arriba, cada minutos hasta que llegue el personal de emergencia (EMS, por sus siglas en inglés).

Inicie los pasos de emergencia EMS (llame al 911) SI el estudiante tiene CUALESQUIERA de los siguientes síntomas:

- < Los labios o las uñas son azules o grises
- <

Si puede darle a su hijo los medicamentos en la casa o después de la escuela, por favor hágalo. Pero si es absolutamente necesario de darle el medicamento durante las horas escolares, deberá de llenar este formulario.

Por este medio doy permiso al director de la escuela local o a su representante de supervisar a mi hijo cuando tome el siguiente medicamento recetado.

Por medio del presente documento desoblijo y absuelvo al Consejo de Educación del Condado de Forsyth, sus empleados y oficiales de toda responsabilidad en caso de un accidente o cualquier otro percance que ocurra durante la supervisión de dicha medicación debido a algún efecto secundario, enfermedad, o cualquier otra lesión que le puede ocurrir a mi hijo durante dicha supervisión. Por medio del presente desoblijo a los oficiales ya mencionados de cualquier responsabilidad debido a cualquier lesión o daño que pueda ocurrir.

Doy mi consentimiento al personal arriba mencionado, para ponerse en contacto con el proveedor de atención médica de mi hijo y/o con la farmacia para obtener información médica sobre el diagnóstico de mi hijo, el medicamento y demás tratamientos necesarios.

Entiendo que:

La administración de medicamentos para los estudiantes durante el día escolar presenta una creciente preocupación y conciencia de la necesidad de tener procedimientos por escrito.

Los medicamentos se pueden dar a los estudiantes con la asistencia del personal de la escuela cuando el médico encuentre necesario de recetar la administración de un medicamento durante el día escolar. El personal de la escuela cooperará con los padres de familia proporcionando un lugar para almacenar el medicamento; sin embargo, la responsabilidad principal de un niño que toma medicamento en la escuela es completamente de los padres de familia.

Una enfermera no esta siempre disponible para asistir en la administración del medicamento. El estudiante puede ser atendido por un adulto asignado por el director.

Los medicamentos con receta y sin receta serán administrados por el personal de la escuela únicamente si se siguen los siguientes reglamentos:

**\*Todos los medicamentos DEBEN estar en su envase original y los DEBEN traer a la escuela el padre o el tutor.** Los medicamentos traídos en bolsas u otros envases sin etiqueta no serán administrados. El medicamento recetado debe estar en el envase original de la farmacia etiquetado con el nombre del niño, fecha, nombre del medicamento, nombre del médico, horario que el medicamento debe ser administrado y el nombre de la farmacia que surte la receta. Solicitamos que usted pida a su farmacéutico que le dé dos envases etiquetados del medicamento para que usted tenga un envase en casa y otro en la escuela.

el padre o tutor (y por el médico si es necesario que el medicamento sea administrado por más de dos semanas tal como Ritalín) y debe de enviarse a la escuela junto con el medicamento.

**\*No envíe medicamento a la escuela que necesita ser administrado dos o tres veces al día a menos que el médico indique la hora exacta que se debe de administrar durante el día escolar.** Un antibiótico que se debe de administrar tres veces al día se puede tomar antes que el niño entre a la escuela, cuando él regrese a casa y antes de acostarse.

\*El personal escolar no puede administrar medicamentos que contengan aspirina a estudiantes menores de 18 años de edad debido a la correlación con el Síndrome de Reyes. Algunos ejemplos son Pepto Bismol, Excedrin Migraña, y Polvo Goody.

La seguridad y el bienestar de su hijo es nuestra preocupación. Con su cooperación y entendimiento podremos eliminar muchos medicamentos innecesarios que se traen a la escuela y asegurar que nuestros estudiantes que necesitan tomar medicamentos en la escuela los reciban apropiadamente. Si usted tiene cualquier pregunta referente al medicamento, favor de llamar a la escuela o la enfermera de la escuela.

---

necesita llevar consigo las siguientes prescripciones